


III, E; ST - ЦЗУ-ЯНМИН - ВЭЙ - ЦЗИН (45 წუთი)
(07-09 სთ)



ფეხები კუჭის პერიოდში

(კანტორიძისულო)

„ЯНМИН“- „ნათელი მამრი“


(„გუბი სისხლი, გუბი ენეზია“)

Канал желудка на ноге-ЯНМИН

„მეზარულა“


2009

ბუნებრივი და მკურნალობითი მკურნალობის
სახეები და მათი მკურნალობა



ფეხზე საყდრის მერდიანები

(07-09 სთ)



ძიგნაღი

მონაკვეთები:

სახე - ღაღი (იანი)
 ფეხი - მონაკ
 აქვს წიგნები - 45 (x2)
 ეხიგნის წიგნები -
 - აქვს 7-8 9-20
 მონაკვეთი -
 - ეხიგნის
 ეხიგნის მონაკ -
 - მონაკვეთი.

Меридиан желудка (Е):

1 — чэн-ци; 2 — сы-бай; 3 — цзюй-ляо;
 4 — ди-цан; 5 — да-ин; 6 — цзя-чэ; 7 —
 ся-гуань; 8 — тоу-вэй; 9 — жэнь-ин;
 10 — шуй-ту; 11 — цц-шэ; 12 — цюэ-
 пэнь; 13 — цц-ху; 14 — ку-фан; 15 —
 у-и; 16 — ин-чуан; 17 — жу-чжун;
 18 — жу-гэнь; 19 — бу-жун; 20 — чэн-
 мань; 21 — лян-мэнь; 22 — гуань-
 мэнь; 23 — тай-и; 24 — хуа-жоу-мэнь;
 25 — тянь-шу; 26 — вай-лин; 27 — ди-
 цзюй; 28 — шуй-дао; 29 — гуй-лай;
 30 — цц-чун; 31 — би-гуань; 32 — фу-
 ту; 33 — инь-ши; 34 — лян-цю; 35 —
 ду-би; 36 — цзუ-сань-ли; 37 — шан-
 цзюй-суй; 38 — тiao-коу; 39 — ся-
 цзюй-суй; 40 — фэн-лун; 41 — цзе-си;
 42 — чун-ян; 43 — сянь-гу; 44 — нэй-
 тин; 45 — ли-дуй.

კუჭის მერიდიანი

ძირითადი სვლა-გეზი

კუჭის მერიდიანი იწყება სხულის შიგნით, ნესტოს გვერდზე არსებულ წერტილში, სადაც მთვარდება მსხვილი ნაწლავის მერიდიანი (LI-20). იგი მიემართება თვალის გარე კუთხისაკენ, კვეთს BL-1 წერტილს. შემდეგ მერიდიანი გარსშემოშვლის თვალს შიდა მხრიდან გაივლის BL-1 წერტილს და დაეშვება ცხვირის გვერდის ზედაპირზე, გაივლის ზედა ღრძილს და გადაკვეთს GV-26 წერტილს ზედა ტუჩზე. აქედან იგი ეშვება ნიკაპისაკენ CO-24 წერტილის გაველით და სახეს გვერდზე ჩაუვლის გაივლის რა GB-3 და GB-6 წერტილებს, შემდეგ ადის შუბლის შუა ნაწილში გადაკვეთს GV-24 წერტილს.

გარე ტოტი გამოიყოფა ყბასთან, ეშვება ყელის გასწვრივ, შედის სხეულის შიგნით, გაივლის მას და ზურგის ზედა ნაწილში გაივლის GV-14 წერტილს. აქედან მერიდიანი მიემართება ქვევით, გაივლის რა დიაფრაგმას გადაკვეთს CO-13 და CO-12 წერტილებს შედის თავის “სახლად წოდებულ” ორგანოში – კუჭში და უერთდება ელენთას. შემდეგი ზედაპირული ტოტი ეშვება ლავიწის ზემოთ ჩაღრმავებიდან (ST-12 წერტილიდან) ქვემოთ, გაივლის მკერდს და მუცელს და მთავრდება საზარდულში (ST-30 წერტილში).

კიდევ ერთი ტოტი, შიდა, იწყება კუჭის ქვევით, ეშვება საზარდულში, უერთდება ზედაპირულ ტოტს ST-30 წერტილში. აქედან ეშვება ტანის გასწვრივ და მთავრდება ფეხის მე-2 თითის ფრჩხილის გარე კუთხეში (ST-45).

კიდევ ორი შიდა ტოტი ფეხის ქვედა არეში მდებარეობს; ძირითადი მერიდიანიდან პირველის განშტოება ხდება ST-36 (მუხლის ქვევით) წერტილიდან და მთავრდება ფეხის შუა თითის გარე მხარეს; მეორე განშტოება იწყება ST-42 (ტერფის ზემოთ) წერტილში და მთავრდება ფეხის დიდი თითის შუაში უერთდება რა ელენთის მერიდიანს SP-1 წერტილში.

ფუნქციები

კუჭის მერიდიანის აკუპუნქტურის წერტილები ზემოქმედებს სახეზე, ცხვირზე, ღრძილებზე, ყელზე, კუჭზე, ნაწლავებზე, საერთო ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია ანთებით პროცესებთან.

ძირითადი მონაცემები

სახეობა – იანი
ელემენტი – მიწა
აკუპუნქტურის წერტილები – 45 (x2)
ცი-ს ნაკადი – აქტიურია 7 სთ-დან - 9 სთ-მდე
შეერთების ადგილი – ელენთა
დაკავშირებულია მსხვილ ნაწლავთან

“ხიუ-ხიუ წერტილთა” ჯგუფი (განსაკუთრებული წერტილები)

წერტილი წყარო (იო-წერტილი) – ST-42
შემაერთებელი ლო-წერტილი – ST-40

ხერელი წერტილი (სი წერტილი) – ST-34
 მაუწყებელი წერტილი (მო წერტილი) – CO-12
 თანამგრობი წერტილი (შუ წერტილი) – BL-21
 ქვედა შემაერთებული წერტილი – არ არის

გადაკვეთის წერტილები (ცზიაო-ხუ წერტილები)

მსხვილი ნაწლავის მერიდიანთან – ST-4, -12, -37
 წვრილი ნაწლავის მერიდიანთან – ST-39
 ნაღვლის ბუშტის მერიდიანთან – ST-5, -7, -8, -12
 ჩასახვის მერიდიანთან – ST-1
 გამჭოლ მერიდიანთან – ST-30
 იანის ქუსლიას მერიდიანთან – ST-1, -3, -4
 სხვა მერიდიანებთან – BL-1, CO-12, CO-13, CO-24, GB-3, GB-4, GB-6, GV-14, GV-24, GV-26

აღნიშვნები აშშ-ში	აღნიშვნები რუსეთში	დასახელება ჩინური/ქართული	განლაგება, მდებარეობა	ადგილის ანატომია (ნერვები და სისხლძარღვები)
ST-1	1 III	ჩენ/ცი ცრემლების საცავი	ზუსტად თვალის გუგის ქვეშ ჩაღრმავებაში, საჩვენებელი თითის გარე მხარეს ფრჩხილის კუთხის ცოტა ზემოთ (დაახლოებით 0,1 ერთ. მანძილზე)	თვალის ქვევით მდებარე ნერვების ტოტი, თვალის მამოძრავებელი ნერვის ქვედა ტოტი, სახის კუნთის ნერვის განშტოება, თვალის ქვედა და მხედველობის არტერიის და ვენის განშტოება
*ST-2	2 III	სი-ბაი/ოთხი თეთრი	ჩაღრმავების ზედა ზღვარზე თვალის გუგის და ST-1 წერტილის დონეზე	წერტილი მდებარეობს ზუსტად თვალის ქვევით, ნერვზე. სახის არტერიის და ვენის განშტოებები, თვალის ქვევით მდებარე არტერია და ვენა
ST-3	3 III	ცზუი-ლიაო/ დიდი ძვალი	ზუსტად თვალის გუგის ქვეშ და ST-1 და ST-2 წერტილებს შორის, ნესტოს ქვედა კიდის დონეზე	სახის და თვალის ქვევით მდებარე ნერვების განშტოებები, სახის და თვალის ქვევით მდებარე არტერია და ვენა
*ST-4	4 III	დი-ცან/მიწიერი ბეღელი	პირის კუთხესთან ახლოს, ზუსტად ST-3 წერტილის ქვევით, აქ ისინჯება სუსტი პულსი	სახის და თვალის ქვევით მდებარე ნერვების განშტოებები, ლოყის ნერვის ბოლო ტოტი და (უფრო დრმად) სახის არტერია და ვენა

*ST-5	5 III	და-ინ/ დიდი მხიარულება	ღარის მაგაუარ ჩაღრმავებაში, ქვედა ყბის ქვედა კიდის გასწვრივ, საღეჭი კუნთის წინა კიდეზე (ისინჯება პულსი)	სახის და ლოყის ნერვები, სახის არტერია და ვენა
*ST-6	6 III	ცზია-ჩე/ ყბის ღერძი	ქვედა ყბის კუთხიდან წინ და ზემოთ 0,75 ერთ. მანძილზე, საღეჭი კუნთის გასქელებულ ადგილთან (დაჭერილი კბილების დროს)	საღეჭი კუნთის მიმაგრების წერტილში. ყურის დიდი ნერვი, სახის და საღეჭი ნერვები
*ST-7	7 III	სია-გუნ/სახსრის ქვეშა ჩაკეტვა	ყურის წინ, ყვრიმალის ქვედა კიდესთან საფეთქლისა და ქვედა ყბის სახსრის წინ	სახის ნერვის ყვრიმალის განშტოება, ყურისა და საფეთქლის ნერვის განშტოება, სახის განივი არტერია და ვენა, ზედა ყბის არტერია და ვენა (უფრო ღრმად)
ST-8	8 III	ტოი-ვეი/ თავის მცველი	შუბლის კიდეზე, თმების ხაზის შემდეგ 0,5 ერთ. მანძილზე, მმართველი მერიდიანიდან გვერდზე 4,5 ერთ. მანძილზე	ურისა და საფეთქლის ნერვის განშტოება და სახის ნერვის საფეთქლის განშტოება, საფეთქლის ზედაპირული არტერიის და ვენის სახის განშტოებები
*ST-9	9 IIII	ვენ-ინ/ მომავლის წინასწარმეტყველების წერტილი	კისრის გვედზე, ადამის ვაშლის გარე კიდის დონეზე, მკერდისა და ლავიწის კუნთის წინა კიდედან საძილე არტერიის გასწვრივ	კისრის კანის ნერვი, სახის ნერვის კისრის განშტოება, ენისქვეშა და მოხეტიალე ნერვის განშტოება, საძილე არტერიის განტოტების წერტილი, ფარისებრი ჯირკვალის არტერია, გარე საუღლე ვენა
*ST-10	10 III	შუი-ტუ/ ჩანჩქერი	მკერდისა და ლავიწის კუნთის წინა კიდეზე, ST-9 და ST-11 წერტილებს შორის	კისრის კანის ნერვი (ზედაპირთან ახლოს), საერთო საძილე არტერია
*ST-11	11 III	ცი-შე/ ცის სახლი	კისრის ძირში, ორივე ლავიწის შიდა კიდეზე, საუღლე ჩაღრმავების კიდეზე	ლავიწზედა მედიალური ნერვი, ენისქვეშა შეერთების კუნთების განშტოება, გარე საუღლე ვენა (ზედაპირთან ახლოს), საერთო საძილე არტერია (უფრო ღრმად)
*ST-12	12 III	ჩიუე-პენ/ ცარიელი ჯამი	ლავიწის შუაში არსებულ ჩაღრმავებაში, ძუძუს თავის დონეზე, ტანის შუა ხაზიდან გვერდზე 4,5 ერთ. მანძილზე	შუა ლავიწზედა ნერვი, (ზედაპირთან ახლოს), მხრის შეერთების ლავიწზედა ნაწილი (უფრო ღრმად), კისრის განივი ვენა
ST-13	13 III	ცი-ხუ/ ცის კერა	ლავიწის შუა ნაწილში არსებულ ჩაღრმავებაში,	ლავიწზედა და წინა მკერდის ნერვების

			მის ქვედა კიდეზე, ძუძუს თავის ზევით საერთო შვეულ ხაზზე	განშტოვებები, მკერდგარშემო არსებული არტერია და ვენა, ლაფიქვედა არტერია
ST-14	14 III	კუ-ფან/ განძის საწვობი	მკერდზე პირველ ნეკნთაშორის არეში (ნეკნებს შორის), ძუძუს თავის ზევით საერთო შვეულ ხაზზე	წინა მკერდის ნერვის განშტოება, მკერდგარშემო არტერია და ვენა, მკერდის ლატერალური არტერიის და ვენის განშტოებები
ST-15	15 III	უ-ი/ თეჯირი	მკერდზე მეორე ნეკნთაშორის არეში (ნეკნებს შორის), ძუძუს თავის ზევით საერთო შვეულ ხაზზე	მკერდის ნერვების კანის განშტოება, მკერდის მედიალური ნერვი, მკერდგარშემო არსებული არტერიების და ვენების განშტოება, მე-2 ნეკნთაშორისი არის არტერია და ვენა
ST-16	16 III	ინ-ჩუან/ მკერდის ფანჯარა	მკერდზე მესამე ნეკნთაშორის არეში (ნეკნებს შორის), ძუძუს თავის ზევით საერთო შვეულ ხაზზე	მკერდის ნერვების კანის განშტოება, მკერდის ლატერალური არტერიის და ვენის განშტოებები
*ST-17	17 III	ჟუ-ჩუნ/ მკერდის ცენტრი	მკერდზე, ძუძუს თავის შუაში. ამ აკუპუნქტურის წერტილის ხშირად იყენებენ როგორც ათელის წერტილს, სხვა მგრძნობიარე წერტილების მოსაძებნად	მე-4 ნეკნთაშორისი არის კანის წინა და ლატერალური ნერვის განშტოებები
*ST-18	18 III	ჟუ-გენ/ მკერდის ფესვი	მკერდზე მე-5 ნეკნთაშორის არეში (ნეკნებს შორის), ძუძუს თავიდან ერთი ნეკნით ქვემოთ, საერთო შვეულ ხაზზე. ამ აკუპუნქტურის წერტილის ხშირად იყენებენ როგორც ათელის წერტილს, სხვა მგრძნობიარე წერტილების მოსაძებნად	მე-5 ნეკნთაშორისი ნერვის განშტოება, ნეკნთაშორისი არტერიის და ვენის განშტოება
ST-19	19 III	ბუ-ჟუნ/ უჰაერობა	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 6 ერთ. მანძილზე, CO-14 წერტილიდან გვერდზე 2 ერთ. მანძილზე	მე-7 ნეკნთაშორისი ნერვის ტოტი, მე-7 ნეკნთაშორისი და საშვილოსნოს ზედა არტერიების და ვენების განშტოებები
ST-20	20 III	ჩენ-მან/ სისავისის შთანთქმვა	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 5 ერთ. მანძილზე, CO-13 წერტილიდან გვერდზე 2 ერთ. მანძილზე, ST-19 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	როგორც ST-19 წერტილში
ST-21	21 III	ლიან-მენ/ სინათლის კარიბჭე	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 4 ერთ. მანძილზე, CO-12 წერტილიდან გვერდზე 2	მე-8 ნეკნთაშორისი და საშვილოსნოს ზედა არტერიების და

			ერთ. მანძილზე, ST-20 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	ვენების განშტოებები
ST-22	22 III	გუან-მენ/ გასასვლელი კარიბჭე	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 3 ერთ. მანძილზე, CO-11 წერტილიდან გვერზე 2 ერთ. მანძილზე, ST-21 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	როგორც ST-21 წერტილში
ST-23	23 III	ტაი- ინ/უმაღლესი ერთობა (ძალიან დიდი საჩუქარი)	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 2 ერთ. მანძილზე, CO-10 წერტილიდან გვერზე 2 ერთ. მანძილზე, ST-22 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	მე-8 და მე-9 ნეკნათაშორისი ნერვების განშტოებები, მე-8 და მე-9 ნეკნათაშორისი და საშვილოსნოს ზედა არტერიების და ვენების ქვედა განშტოებები
ST-24	24 III	ხუა-ჟოუ-მენ/ სრიალა ხორცის კარიბჭე	მუცელზე, ჭიპიდან ზემოთ 1 ერთ. მანძილზე, CO-9 წერტილიდან გვერზე 2 ერთ. მანძილზე, ST-23 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	მე-9 ნეკნათაშორისი ნერვის ტოტი, მე-9 ნეკნათაშორისი და საშვილოსნოს ზედა არტერიების და ვენების განშტოებები
ST-25	25 III	ტიან- შუ/ზეციური ცენტრი	მუცელზე, ლატერალური ჭიპის ცენტრიდან 2 ერთ. მანძილზე (CO-8 წერტილი)	მე-10 ნეკნათაშორისი და საშვილოსნოს ზედა არტერიების და ვენების განშტოებები
ST-26	26 III	ვაი-ლინ/ გარე სამყაროს ბორცვი	მუცელზე ჭიპიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე, ლატერალურ CO-7 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე, ST-25 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	როგორც ST-25 წერტილში
ST-27	27 III	და-ცხუი/ უდიდესი მოვლენა	მუცელზე ჭიპიდან ქვევით 2 ერთ. მანძილზე, ლატერალურ CO-5 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე, ST-26 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	მე-11 ნეკნათაშორისი ნერვი, ნეკნათაშორისი არტერიის და ვენის განშტოება, საშვილოსნოს ზემოთ არსებული ქვედა არტერია და ვენა
ST-28	28 III	შუი-დაო/ წყლის გზა	მუცელზე, ჭიპიდან ქვევით 3 ერთ. მანძილზე, ლატერალურ CO-4 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე, ST-27 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	თეძოსქვეშა ნერვის ტოტი, თეძოსქვეშა არტერიის და ვენის განშტოებები, საშვილოსნოს ზემოთ არსებული ქვედა არტერია და ვენა
ST-29	29 III	გუი-ლაი/ დაბრუნება	მუცელზე ჭიპიდან ქვევით 4 ერთ. მანძილზე, ლატერალურ CO-3 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე, ST-28 წერტილიდან ქვევით 1 ერთ. მანძილზე	საშვილოსნოს ქვევით მდებარე ნერვი, საშვილოსნოს ზემოთ არსებული ქვედა არტერიები და ვენა

ST-30	30 III	ცი-ჩუნ/ ცის მეცხრე ტალღა	ჭიბიდან ქვევით 5 ერთ. მანძილზე, ლატერალურ CO-2 წერტილიდან 2 ერთ. მანძილზე, საზარდულის ზემოთ, თემოს არტერიეს მედიალურ მხარეს	საზარდულის ნერვების გზა, საშვილოსნოს ზემოთ არსებული ზედა არტერიები და ვენა, საშვილოსნოს ზემოთ არსებული ქვედა არტერიები და ვენა, თემოს არტერია (ისინჯება პულსი)
ST-31	31 III	ბი-გუნ/ თემოს ბარიერი	თემოზე ჩაღრმავებაში კუნთის გვერდზე (სახსარი მოხრილია), საზარდულის დონეზე	თემოს კანის ლატერალური ნერვი, თემოს ლატერალური არტერია და ვენა, რომელიც შემოხვეულია თემოს ძვალზე (ისინი უფრო ღრმად გადიან)
ST-32	32 III	ფუ-ტუ/ დაგრავნილი კურდღელი	თემოზე, მუხლის კვირისთავის გვერდითი ზედა კიდიდან ზევით 6 ერთ. მანძილზე, თემოს პირდაპირი კუნთის გამსხვილების შუა ნაწილში	თემოს კანის წინა და ლატერალური ნერვი, თემოს ლატერალური არტერიის და ვენის განშტოება
ST-33	33 III	ინ-ში/ ინის ბაზარი	თემოზე, მუხლის კვირისთავის გვერდითი ზედა კიდიდან ზევით 3 ერთ. მანძილზე, თემოს პირდაპირი და თემოს ოთხთავა კუნთის გვერდით მორჩს შორის	თემოს კანის წინა და ლატერალური ნერვი, ლატერალური და თემოს ძვალზე გარშემოხვეული არტერიის გამავალი ტოტი
ST-34	34 III	ლიან-ციუ/ სინათლის მთა	თემოზე, მუხლის კვირისთავის გვერდითი ზედა კიდიდან ზევით 2 ერთ. მანძილზე, თემოს პირდაპირი და თემოს ოთხთავა კუნთის გვერდით მორჩს შორის	როგორც ST-33 წერტილში
*ST-35	35 III	დუ-ბი/ ხბოს ცხვირი	მუხლს ქვედა ჩაღრმავებაში, კვირისთავის მყესის გვერდითა მხარეს, მოხრილი მუხლის მდგომარეობაში	წვივის კუნთის კანის ლატერალური ნერვი, საერთო პატარ წვივის ნერვის სახსრის ტოტი, მუხლის სახსარს შემოხვეული არტერიების და ვენების ქსელი
*ST-36	36 III	ცზუ-სან-ლი/ სამი ლი ფეხზე	ფეხის ქვედა ნაწილზე ST- 35 წერტილიდან ქვევით 3 ერთ. მანძილზე, დიდი წვივის ძვალის ლატერალური ქიმიდან დაახლოებით 1 ერთ. მანძილზე (წვივის)	წვივის კუნთის კანის ლატერალური ნერვი, თემოს ნერვის კანის მგრძნობიარე ტოტი (ზედაპირთან ახლოს), პატარა წვივის ძვალის ღრმა ნერვი (უფრო ღრმად), დიდი წვივის ძვალის წინა არტერია და ვენა
ST-37	37 III	შან-ცზიუი-სიუი/ ფეხის ქვედა ნაწილზე	ფეხის ქვედა ნაწილზე ST-	როგორც ST-36

		ზედა გიგანტური ორმო	35 წერტილიდან ქვევით 6 ერთ. მანძილზე, დიდი წვივის ძვალის ლატერალური წინა ქიმიდან დაახლოებით 0,75 ერთ. მანძილზე (წვივის)	წერტილში
ST-38	38 III	თიან-კოუ/ ხერელი ლენტში	ფეხზე, ფეხის ქვედა ნაწილზე ST-35 წერტილიდან ქვევით 6 ერთ. მანძილზე, ST-35 წერტილიდან ქვევით 8 ერთ. მანძილზე, ST-35 და ST-41 წერტილების შუაში, დიდი წვივის ძვალის ქიმის გვერდით	როგორც ST-36 წერტილში
ST-39	39 III	სია-ცზიუი-სიუი/ ქვედა გიგანტური ორმო	ფეხის ქვედა ნაწილზე დიდი წვივის ძვალის ლატერალური 0,75 ერთ. მანძილზე, ST-37 წერტილიდან ქვევით 3 ერთ. მანძილზე, მუხლის ქვევით 9 ერთ. მანძილზე (ST-35 წერტილი)	პატარა წვივის ძვალის ზედაპირული და ღრმა ნერვების განშტოებები, დიდი წვივის წინა არტერია და ვენა
*ST-40	40 III	ფენ-ლუნ/ დიდი გირჩა	ფეხის ქვედა ნაწილზე ლატერალური ST-38 წერტილიდან 0,75 ერთ. მანძილზე, ST-35 წერტილიდან ქვევით 8 ერთ. მანძილზე, კოჭიდან ზევით 8 ერთ. მანძილზე	პატარა წვივის ძვალის ზედაპირული ნერვი, დიდი წვივის წინა არტერია და ვენა
ST-41	41 III	ჩზე-სი/ ღვთიური ხეობა	კოჭის სახსარის მეყსებს შორის ფეხის თითების და დიდი თითის გამშლელი კუნთები, წინგამოწეული ძვლის დონეზე	პატარა წვივის ძვალის ზედაპირული და ღრმა ნერვები, დიდი წვივის ძვალის წინა არტერია და ვენა
ST-42	42 III	ჩუნ-იან/ იანის მეცხრე ტალღა	ტერფის ზედა ნაწილის უმაღლესი წერტილი, მე-2 და მე-3 ძელებს შორის ჩაღრმავებაში	ზედაპირული მედიალური ნერვიდან განშტოების ადგილზე კანის უკანა მედიალური ნერვი (ზედაპირიდან ახლოს), პატარა წვივის ღრმა ნერვი (უფრო ღრმად), ტერფის უკანა არტერია და ვენა, ტერფის ვენების ქსელი
ST-43	43 III	შიან-გუ/ წყალქვეშა ხეობა	ტერფის ზედა ნაწილზე, მე-2 და მე-3 ძელებს შორის ჩაღრმავებაში	ტერფის უკანა მედიალური კანის ნერვი, ტერფის უკანა ვენების ქსელი
ST-44	44 III	ნეი-ტინ/ შიდა ეზო	ფეხის მე-2 და მე-3 თითებს შორის ჩაღრმავებაში უფრო ღრმად და მეორე ფალანგის სახსრიდან გვერდზე	წერტილი, სადაც ტერფის უკანა კანის მედიალური ნერვის ლატერული ტოტი იყოფა თითების უკანა ნერვებზე, ტერფის უკანა ვენების ქსელი
ST-45	45 III	ლი-დუი/ მკაცრი პირი	ფეხის მე-2 თითის გვერდითა მხარეს,	თითების უკანა ნერვი, იმ ადგილზე სადაც

			ფრჩხილის კუთხიდან 0,1 ერთ. მანძილზე (ზევით)	ხდება მისი განშტოება პატარა წვივის ზედაპირული ნერვიდან, თითების უკანა არტერიებით და ვენებით შექმნილი არტერიების და ვენების ქსელი
--	--	--	--	---

კუჭის მერიდიანი - იაშინი ფეხზეა

სიაგუნ	E 7 (5)		ყვრიმალის თალის ქვედა კიდეზე, ქვედა ყბის კუნთის მორჩის წინ
ტოუვეი	E 8 (1)		თავის თმიანი ნაწილის დასაწყისიდან 0,5 ცუნის მანძილზე, პორიზონტალური ზღვარის ვერტიკალურში გადასვლის ადგილზე
ციხუ	E 13		შუა ლავიწის ხაზის გასწვრივ ზუსტად ლავიწის ქვეშ
ციჩუნ	E 30		მკერდთან მდებარე ხაზის გაგრძელებაზე, 2 ცუნის მანძილზე ლატერალურად და ჭიპიდან ქვევით 5 ცუნის მანძილზე
ცზუსანლი	E 36	შუ 5	წერტილიდან ქვევით 3 ცუნის მანძილზე წვივის დიდი ძვალის ლატერალურ ბორცვის კიდეზე და საჩვენებელი თითის სიგანეზე წვივის დიდი ძვალის წინა კიდიდან ლატერალურ არეში. თუ ხელს დავადებთ მუხლს ისე, რომ თითები მიეხებოდნენ წვივს, მაშინ შუა თითის წვერი მიეხებოდნენ წერტილს “ცზუსანლი”
ლიდუი	E 45	შუ 1	ტერფის მე-2 თითის წვერზე, ქვედა მხრიდან ლატერალურ არეში, ორი ხაზის გადაკვეთაზე, რომლებიც გაველებულია პარალელურად ფრჩხილის ლატერალურ და დაფარულ კიდეზე

ვუჭის მკურნალობის

მნიშვნელობის გეოგრაფიკა

Важные точки

Канала Желудка

განსაკუთრებული აქტიური წერტილების აღნიშვნა	
“უ-შუ” წერტილთა ჯგუფი (5 ელემენტი)	
○ ლითონი	● მიწა
● წყალი	● ცეცხლი
● ხე	
“შუ წერტილთა” ჯგუფი (მერიდიანი მდინარე)	
შუ-1 — “წყარო, ჭა”	შუ-4 — “მდინარის მომუშავე არხები”
შუ-2 — “ნაკადულები”	შუ-5 — “მდინარის შესართავი”
შუ-3 — “მდინარის გადასასვლელი”	
“ზიუ-ხიუ” წერტილთა ჯგუფი (განსაკუთრებული წერტილები)	
□ იუ წერტილი - წყარო (დამხმარე) წერტილი (მწვანე/წითელი) □ ლო წერტილი - შემაერთებული წერტილი (შავი) ◻ სი წერტილი - ხვრელი წერტილები (შავი) ▲ მო წერტილი - მაუწყებელი წერტილი (წითელი) ▲ შუი წერტილი - თანამგრძნობი წერტილი (მწვანე) □ ხუ წერტილი - მატონიზირებელი წერტილი (წითელი) შეხვედრის წერტილი □ ჰუ წერტილი - სედატიური წერტილი (მწვანე) ◻ ბუ წერტილი - მმართველი წერტილი (წითელი)	
“ცზიაო-ხუ” - წერტილთა ჯგუფი	
X “ცზიაო-ხუ” სხვა მერიდიანთან გადაკვეთის წერტილი. (შავი).	

III

ფეხზე კუჭის პერიდიანი (E; ST)

(43Y-ЯНМНН-БЗН-43ИН) (45 წეხტილი)
(„ნათელი მამხი“-„ზევხი სისხტი, ბევხი ენეხია“)

მნიშვნელოვანი წერტილები

1) “უ-შუ” - წერტილთა ჯგუფი (5 ელემენტი):

○ → 45-III-ЛН-ДУН; ● → 44-III-НЗН-ТИН ● → 42-III-УУН-ЯН
(ლითონი) (წყალი) (ხე) 43-III-СЯНБ-ГГ
● → 41-III-ДЗЕ-СИ ○ → 36-III-43Y-САНБ-ЛН
(ცეცხლი) (მიწა)

2) “შუ - წერტილთა ჯგუფი (“პერიდიანი - მდინარე”)

შუ - 1 (“წყარო”) - 45-III-ЛН-ДУН; შუ - 4 (“მიმუშავე არხები”) -
შუ - 2 (“ნაკადულები”) - შუ - 5 (“შესართავი”) - 36-III-43Y-САНБ-ЛН
შუ - 3 (“გადასასვლელი”) -

3) “ხიუ-წერტილთა ჯგუფი (განსაკუთრებული წერტილები)”

□ → (დამხმარე) → <u>42-III-<u>УУН-ЯН</u></u> “იუ”	□ → (შემაერთ.) → <u>40-III-<u>ФЗН-ЛУН</u></u> “ლო” (მასწავლებელი ზღო - IV ჯგუფი)
□ → (ხვრელი) → <u>34-III-<u>ЛАН-40</u></u> “სი”	△ → (მაუწყ.) → <u>25-III-<u>ТЯНБ-14Y</u></u> “მო” <u>12-<u>ХIV</u>-<u>УУУН-БЗН</u></u>
△ → (თანამგდნ.) → <u>21-<u>VII</u>-<u>БЗН-У</u></u> “შუი”	□ → (მატონ.) → <u>41-III-<u>ДЗЕ-СИ</u></u> “ზუ” → (შეგვ.) →
□ → (სედატ.) → <u>45-III-<u>ЛН-ДУН</u></u> “პუ”	□ → (მმართველ.) → “შუ” (ზემოქმედ.) →
	□ → (შემაერთ.) → <u>42-III-<u>УУН-ЯН</u></u> “ლო”-2 (IV-ჯგუფი)

4) “ცზიო-ხუ” - წერტილთა ჯგუფი (გადაკვეთის წ.)

X იკვეთება - 21.6.წ. პერიდიანთან - III-4, 12, 37.
“ცზიო-ხუ” - 6.3.წ. პერიდიანთან - III-39.
- ნათ. წ. პერიდიანთან - IV-5, 7, 8, 12.
- ნათ. შუა პერიდიანთან (XIV) - IV-1.
- სა. პერიდიანთან - I-VI, 12-XIV, 13-XIV, 24-XIV, 3-XI, 4-XI, 6-XI,
14-XIV, 24-XIV, 26-XIV.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ УПОМИНАЮЩИХСЯ АКТИВНЫХ ТОЧЕК

1	2	3	4	5
III. Желудка Янмин на ноге	сягуань	Е 7(5)		Под нижним краем скуловой дуги, кпереди от мышечкового отростка нижней челюсти
	тоувэй	Е 8(1)		На 0,5 цунь выше угла начала волосистой части головы, в месте перехода из горизонтальной в вертикальную ее границу
	циху	Е 13		Непосредственно под ключицей по среднечлениковой линии
	цичун	Е 30		На продолжении окологрудной линии, на 2 цунь латеральнее и на 5 цунь ниже пупка
	цзусаньли	Е 36	шу 5	На 3 цунь ниже точки Е 35 дуби и верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости и на ширину указательного пальца латеральнее переднего края большеберцовой кости. Если положить ладонь на надколенник так, чтобы пальцы были прижаты к голени, то кончик среднего пальца указывает на точку цзусаньли
	лидуй	Е 45	шу 1	На латеральной стороне тыла кончика 2-го пальца стопы, на пересечении двух линий, проведенных параллельно скрытому и латеральному краям ногтя

— Ответственные точки каналов (ушу); они же главные точки Пяти элементов; транспортные, античные, командные, точки барьеров.


Шу 1: Источник, Колодец (Цзин); точка-корень, узловая точка.

Шу 2: Ручей (Ин).

Шу 3: Переправа (Шу).


Шу 4: Канал (Цзин).

Шу 5: Слияние, Устье (Хэ).



III և IV հեռերը չեն կարողանում հիմնական
 5 շահերը և զբաղվելով ("ԶԵՆ") հիմնական.



III. չափիւն թշուառութիւն (A)



III. 37506 2760000 (B)

Меридиан желудка (В):

1 — чэн-ци; 2 — сы-бай; 3 — цзюй-ляо;
4 — би-чан; 5 — да-ин; 6 — цзя-чэ; 7 —
ся-гуань; 8 — тоу-вэй; 9 — жэнь-ин;
10 — шуй-ту; 11 — цз-шэ; 12 — цюэ-
пэнь; 13 — цз-ху; 14 — ку-фан; 15 —
у-и; 16 — ин-чун; 17 — жу-чжун;
18 — жу-вэнь; 19 — бу-жун; 20 — чэн-
мань; 21 — лян-мэнь; 22 — гуань-
мэнь; 23 — тай-и; 24 — хуа-жоу-мэнь;
25 — тамь-шу; 26 — вэй-лим; 27 — да-
цзюй; 28 — шуй-дао; 29 — гуй-лай;
30 — цз-чун; 31 — би-гуань; 32 — фу-
ту; 33 — инь-ши; 34 — лян-цю; 35 —
ду-би; 36 — цзю-сань-ли; 37 — шан-
цзюй-сюй; 38 — тло-коу; 39 — ся-
цзюй-сюй; 40 — фэн-лун; 41 — цзе-си;
42 — чун-лян; 43 — сянь-гу; 44 — нэй-
тин; 45 — ли-ду.



2760000 (B)

0. 20-11 (ин-сян) →
1. 37506 2760000 →
2. 37506 2760000 →
3. 37506 2760000 →
4. 37506 2760000 →
5. 1-VII (цин-мин)

14-XII - А2-ЧИНУЧ


20-II - ин-сян (X)

26-XIII - ин-сян - чин-мин

24-XIV - ин-сян

III. Հոգնե ճղորոն (C)

3. МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (ST)



ցոյքներ (III) թիքաճուր քանակութիւնը -

- քիմ-տեղեկութիւն (գրեթէ) ձեռնարկ

Կոյքներ թիքաճուր քիմ-տեղեկութիւն ձեռնարկ
5-III-9A-44 Երկրորդ օրը և յաջորդ օրը, քիմ-
քանակութիւնը; թիք 9-III-117H-44 Երկրորդ (գա-
նի Երկրորդ 15 օրը թիք), Երկրորդ օրը և Երկրորդ
Երկրորդ թիքաճուր քիմ-տեղեկութիւն, Երկրորդ, Երկրորդ
և Երկրորդ թիքաճուր քիմ-տեղեկութիւն 12-III-1407-117H Երկ-
րորդ (Երկրորդ թիքաճուր Երկրորդ), Երկրորդ թիքաճուր
Երկրորդ և Երկրորդ Երկրորդ թիքաճուր.

Քիմ-տեղեկութիւն թիք Երկրորդ թիք Երկրորդ թիք
և Երկրորդ թիք Երկրորդ և Երկրորդ 30-III-44-44H
Երկրորդ (Երկրորդ թիք Երկրորդ Երկրորդ), Երկրորդ "Երկ-
րորդ" (Երկրորդ Երկրորդ), Երկրորդ, և Երկրորդ թիք
31-III-84-117H Երկրորդ (Երկրորդ Երկրորդ);
Երկրորդ թիքաճուր թիք Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ
Երկրորդ և Երկրորդ 45-III-14-94H Երկրորդ
(Երկրորդ II Երկրորդ Երկրորդ թիք Երկրորդ 0,3 Երկրորդ).

Երկրորդ թիք Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ:

Երկրորդ թիքաճուր: 42-III-44H-94H Երկրորդ
Երկրորդ (Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ) II և III Երկրորդ
Երկրորդ Երկրորդ և Երկրորդ 1-IV-117H-84H Երկրորդ
(Երկրորդ I Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ 0,3 Երկրորդ), Երկրորդ
IV (Երկրորդ / Երկրորդ Երկրորդ).

Երկրորդ թիքաճուր: 36-III-434-84H-14 Երկրորդ Երկրորդ
և Երկրորդ Երկրորդ II Երկրորդ թիք Երկրորդ թիք.

Քիմ-տեղեկութիւն (գրեթէ) ձեռնարկ 12-III-1407-117H
Երկրորդ, Երկրորդ Երկրորդ թիքաճուր թիքաճուր
Երկրորդ, Երկրորդ "Երկրորդ", և Երկրորդ Երկրորդ.
Երկրորդ թիքաճուր Երկրորդ թիքաճուր Երկրորդ, Երկրորդ
Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ, Երկրորդ Երկրորդ, Երկրորդ Երկրորդ
և 30-III-44-44H Երկրորդ Երկրորդ, Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ.

3. МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (ST)



LI-20

迎香

⊕針灸甲乙經

げいこう

Geikō

Yíngxiāng

【別名】 衛陽

手陽明大腸經

Large Intestine Meridian (LI)

Shōuyángmíng Dàcháng Jīng xué

20-11- NH-CQH

20-11- NH-CQH

□ mm (11)



鼻翼点の高さで、鼻唇溝中に
ある。

□ 1hbal 2mm 5hpa, 2m-5hpa

素問：鼻空外廉（氣府論）



甲乙：在禾髻上鼻下孔傍

銅人：在禾髻上1寸鼻孔傍5分

發揮：在禾髻上1寸，鼻孔傍5分

大成：禾髻上1寸，鼻下孔傍5分

概要：在与鼻翼外縁中点平齊の鼻唇溝裏



S-1

承泣

針灸甲乙經

しょうきゅう

Shōkyū

Chéngqì

【別名】 窻穴 窻穴 面膠

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

1-III - 43H-CU -

位置

瞳孔の直下で、眼窩下縁にある。

系問：目下（氣府論）

甲乙：在目下7分直目瞳子



銅人：在目下7分，直目瞳子陷中

發揮：在目下7分，直瞳子

大成：目下7分，直瞳子陷中

概要：在眼球与眶下縁之間正中

1 shōkyū 1-en
Chōkyōsen



S-2
四白

針灸甲乙經

しはく


Shihaku

Sibái


足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué



2-117 - сбл-б2н



S-3

巨髎

⊕針灸甲乙經

こりょう

Koryō

Jùliáo



【別名】 臣髎

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

3-111-43104-190



GV-26

水溝

針灸甲乙經

すいこう

Suikō

Shuīgōu



督脈

Governor Vessel (GV)

Dūmài xué

【別名】 鬼宮 鬼市 鬼客廳 人中 鼻人中

26-XII-147H6-4111H



S-4
地倉

⊕針灸甲乙經

ちそう

Chisō

Dicāng



【別名】胃維 会維

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

4-111 - DU-42H



CV-24

承漿

④ 靈樞・経脈

しょうしょう

Shōshō

Chéngjiāng



任脈

Conception Vessel (CV)

Rénmài xué

【別名】 鬼市 懸漿 重漿 天池 鬼弔

24-XIV - 47H-439H



S-5
大迎

素問・氣穴論

だいげい

Daigei


Dàiyíng

【別名】 髓孔 天迎


足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué



5-111 - D2-111



G-3
上関

④素問・氣穴論

じょうかん

Jōkan

Shàngguān



足少陽胆経

Gall-bladder Meridian (G)

Zúshàoyáng Dǎnjīng xué

【別名】 客主 客主人 太陽 容主


3-XI - 424-ry2H6



G-6
懸釐
⊕針灸甲乙經


けんり
Kenri
Xuánli

足少陽胆経
Gall-bladder Meridian (G)
Zúshàoyáng Dǎnjīng xué



6-XI-

-C102H6-AN



G-4

頤 厭

針灸甲乙經

がんえん

Ganen

Hànyàn



足少陽胆經

Gall-bladder Meridian (G)

Zúshàoyáng Dǎnjīng xué

4-XI-

-X2H6-9H



— S-8

頭維

⊕針灸甲乙經

ずい

Zui


Tóuwéi

【別名】 額大

足陽明胃經


Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué



8-111-

-TOY-B34



GV-24

神庭

⊕針灸甲乙經

しんてい

Shintei



Shéntíng

督脈

Governor Vessel (GV)

Dūmài xué

24-XIII - 山ヲHb - TUIH



S-9
人迎

④ 素問・六節脈象論

じんげい

Jingei

Rénying



【別名】 五会 天五会

足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wéijīng xué

9-111 - 水7H6-4H



GV-14

大椎

④素問・血氣形志

だいつい

Daitsui

Dàzhū

督脈



Governor Vessel Meridian (GV)

Dūmài xué

【別名】 百勞 大柱 大杼

Да-чжуи

14-XII - Да-чжуи - "большой позвонок".



— CV-12 —
中脘

針灸甲乙經

ちゅうかん

Chūkan

Zhōngwǎn

任脈



Conception Vessel (CV)

Rénmài xué

【要穴】 募穴(胃) 全穴 【別名】 胃脘 上紀 太倉 太倉上紀 中管

① shbns duybybber bshygr

12-XIV-41KYH-BAH6



S-12

缺盆

（素問・痿論）

けつぽん

Ketsubon

Quēpén



【別名】 天蓋 尺蓋

足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

5m5n6 2y6n9n5n (111, E, ST) - 12-111 -
- 12-111 -



S-25

天枢

⊕素問・六微旨大論

てんすう

Tensū


Tiānshū

足陽明胃経


Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

【要穴】 募穴(大腸) 【別名】 穀門 循元 循際 長谿 長雞 長谷 補元 谷門



25-11-1946-119



S-30

氣衝

針灸甲乙經

きしゅう

Kisyō


Qichōng

【別名】 氣街 羊屎 氣堂


足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué



30-111 - 44-444



S-34

梁丘

⊕針灸甲乙經

りょうきゅう

Ryōkyū

Liángqiū

【要穴】 郄穴



足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

【別名】 鶴頂

34-111-194-410



S-36

足三里

⊕素問・針解

あしさんり

Ashi Sanri

Zúsānlǐ



足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

【要穴】 合穴 【別名】 鬼邪 下陵 下陵三里 下三里

36-111 - 439 - 2216 - 111



S-37

上巨虚

素問・氣穴論

じょうこきよ

Iōkokyo

Shàngjùxū

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)




Zúyángmíng Wèijīng xué

【別名】 巨虚上廉 上廉 足上廉

37-117, ШАН-43104-СЮУ.

37-117 ШАН-43104-СЮУ

37-117 ШАН-43104-СЮУ



S-39

下巨虚

④素問・針解

げこきょ

Gekokyo

Xiàjūxū




【別名】 下廉 巨虚下廉 巨虚 足下廉

足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

39-111 - C9-43104 - C104



S-40

豐隆

⊕ 豐極・根結

ほうりゅう


Hōryū

Fēnglóng

足陽明胃經


Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué



④ III shbnc IV shbnc
3-58(35250 (112m))
80h0250

40-III - ΦZH-AYH
□



S-41

解谿

④ 靈樞・本輸

かいけい

Kaikei

Jiěxī

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

【要穴】 經穴 【別名】 鞋常

41-111 - 43E-CU

位置

足背の外果頂点の高さで、長母指伸筋腱の外縁にある。

靈樞：上衝陽1寸半陷者中(本輸)

甲乙：在衝陽後1寸5分腕上陷者中

銅人：在衝陽後1寸5分

彙編：在衝陽後1寸5分、腕上陷中



大成：衝陽後1寸5分、腕上陷中

概要：在足背与小腿交界处，当趾長伸筋腱与跗長伸筋腱之間，約与外踝高点相平


①

shb n b
sm 28 96 58 n
80 h 10 n r

41-111 -
43E-CU
□ - .69"



主治



S-42
衝陽

⊕素問・氣交變大論

しょうよう

Shōyō

Chōngyáng


足陽明胃経

Stomach Meridian (S)


Zúyángmíng Wèijīng xué

【要穴】 原穴 【別名】 会原 会源 跌陽 会骨 迎香 跗上

① shōnō probōkyō (Gyōshin) Gōhōshin 42-III - 44H-9H



42-III - 44H-9H
0 63 12 - 12"



S-43

陷谷

三焦・本輸

かんこく

Kankoku

Xiàngǔ




【要穴】 俞穴

足陽明胃經

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

43-111 - СЯН6-гУ



S-44

内庭

⊕ 靈樞・本輸

ないてい

Naitei

Nèitíng



【要穴】 榮穴

足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué

44-117- H7U-TUH



S-45

厲兌

⊕ 素問・陰陽離合論

れいだ

Reida

Lìduì

足陽明胃経

Stomach Meridian (S)

Zúyángmíng Wèijīng xué


【要穴】 井穴

45-Ⅱ - ㄣ - ㄥ

□ - ㄣ; ㄣ - 1; ○ - ㄣ, ㄣ.



足の第2指外側で爪甲角から
後方2mmにある。



素問：中指爪甲上(繆刺論)

甲乙：在足大指次指之端去爪甲角如韭葉


銅人：在足大指次指之端，去爪甲如韭葉

彙編：在足大指次指去爪甲如韭葉

大成：足大指次指之端，去爪甲角如韭葉

概要：在第2趾外側，趾甲角後1分許

腓骨 脛骨




長指伸筋(腹)

長母指伸筋(腹)



厲兌

45-Ⅱ



胃俞

いゆ

足太陽膀胱経

Iyu

Bladder Meridian (B)

Wèishū

Zútàiyáng pángguāngjīng xué

21-VII-B34-WY

【要穴】 俞穴

III) Jhhah aw 6028 h26c 60hph5n Δ „Jy“

